

مراقبت از غام یافته کودک سالم (ویژه پزشک)

W.C.C

رت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دفتر سلامت خانواده و جمیعت
اداره سلامت کودکان



صفحه	نمودارها	صفحه	پیگیری	صفحه	مشاوره با مادر	صفحه	ارزیابی و طبقه بندی
۲۱	وزن به سن کمتر از ۳ سال - پسر	۱۹	مشکلات تغذیه ای	۱۵	مشکلات تغذیه ای	۲	ارزیابی کودک کمتر از ۲ ماه از نظر نشانه های خطر
۲۲	وزن به سن کمتر از ۳ سال - دختر	۱۹	اختلال رشد یارشدن اعلوم	۱۵	طرز صحیح شیردهی و بغل کردن	۲	ارزیابی کودک ۲ ماهه تا ۸ سال از نظر وضعیت عمومی
۲۳	وزن به سن بالای ۳ سال - پسر	۱۹	رشد قدری نامطلوب یا نامعلوم	۱۵	توصیه درمانی برای برفک	۳	ارزیابی شیرخوار در اولین معاینه
۲۴	وزن به سن بالای ۳ سال - دختر	۱۹	دورسرو نامطلوب یا نامعلوم	۱۶	پیشگیری از حوادث و سوانح در زیر یک سال	۴	ارزیابی کودک کمتر از ۲ ماه از نظر زردی
۲۵	قد به سن کمتر از ۲ سال - پسر	۲۰	مشکل تکاملی ندارد	۱۷	پیشگیری از حوادث از یک سالگی تا ۶ سالگی	۵	ارزیابی کودک از نظر وضعیت وزن
۲۶	قد به سن کمتر از ۲ سال - دختر	۲۰	زردی	۱۸	رابطه مقابل کودک و والدین کمتر از ۲ سال	۶	ارزیابی کودک از نظر وضعیت قد
۲۷	قد به سن بالای ۲ سال - پسر	۲۰	برفک			۷	ارزیابی کودک از نظر وضعیت دورسرو
۲۸	قد به سن بالای ۲ سال - دختر					۸	ارزیابی کودک از نظر وضعیت تغذیه
۲۹	دورسرو به سن کمتر از ۱۸ ماه - پسر					۹	جدول توصیه های تغذیه ای برای گروه های سنی
۳۰	دورسرو به سن کمتر از ۱۸ ماه - دختر					۱۰	ارزیابی کودک از نظر وضعیت بینایی
						۱۱	ارزیابی کودک از نظر وضعیت تکامل
						۱۲	جدول تکامل کودکان برای گروه های سنی کمتر از ۲ سال
						۱۳	جدول تکامل برای گروه های سنی ۳ سال تا ۸ سال
						۱۴	ارزیابی کودک از نظر واکسیناسیون
						۱۴	ارزیابی کودک از نظر وضعیت مکمل های دارویی

ارزیابی، طبقه بندی و توصیه های کودک سالم کمتر از ۱ سال

- مشخص کنید برای مراقبت های دوره ای آمده است یا برای مراقبت ویژه مراجعه کرده است؟
- اگر برای مراقبت ویژه آمده به قسمت پیگیری مراجعه نمایید.
- اگر برای مراقبت های دوره ای مراجعه کرده کودک را به ترتیب زیر ارزیابی کنید:

ارزیابی شیرخوارکمتر از ۲ ماه از نظر نشانه های خطر :

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه ها
درصورت مشاهده هریک از نشانه های خطر شیرخوار نیاز به توجه فوری داشته، ارزیابی و درمان قبل از ارجاع رامطابق چارت مانا انجام داده و سریعاً ارجاع نمائید	احتمال عفونت باکتریال شدید (۱)	<ul style="list-style-type: none"> • درصورت داشتن هریک از نشانه های خطر(جذب-زنپض و صدای غیرطبیعی و توده شکمی)
در اولین فرصت به مرکز تخصصی ارجاع دهد	مشکل جدی احتمالی (۲)	<ul style="list-style-type: none"> • نیض غیر طبیعی • ضربان و صدای غیرطبیعی • توده شکمی
مادر را تشویق کنید که در مراقبتها بعدی مراجعه کند	مشکل جدی ندارد (۳)	<ul style="list-style-type: none"> • هیچکدام از نشانه های فوق را نداشته باشد

طبقه بندی
کنید

شکم	حال عمومی	قفسه سینه
دیستانسیون	<ul style="list-style-type: none"> • کاهش سطح هوشیاری • رفلکس های غیرطبیعی • تونیسیتیه غیرطبیعی • برآمدگی ملاج • درجه حرارت غیرطبیعی • رنگ پریدگی • سیانوز مخاط ها • زردی ۲۴ ساعت اول • ادم 	<ul style="list-style-type: none"> • تنفس تند (۶ بار در دقیقه یا بیشتر) • پرش پره های بینی • توکشیده شدن قفسه سینه • ناله کردن • نیض غیر طبیعی اندام ها • ضربان و صدای غیرطبیعی

ارزیابی کودک ۲ ماهه تا ۸ سال از نظر وضعیت عمومی:

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه ها
درصورت خوب بودن حال عمومی، کودک را ارزیابی بیشتر کنید درصورت عدم امکان ارزیابی به مرکز تخصصی ارجاع دهد	مشکل جدی احتمالی (۱)	<ul style="list-style-type: none"> • درصورت داشتن هر یک ازعایم
مادر را تشویق کنید که در مراقبتها بعدی مراجعه کند	مشکل جدی ندارد (۲)	<ul style="list-style-type: none"> • هیچکدام از علایم فوق را نداشته باشد

طبقه بندی
کنید

اندام هاولگن	شکم	قلب و عروق	حال عمومی
پاتو اسپلنو مگالی	<ul style="list-style-type: none"> • دررفتگی مادرزادی لگن • راه رفتن غیرطبیعی 	<ul style="list-style-type: none"> • نیض غیر طبیعی • سوعل غیرطبیعی 	<ul style="list-style-type: none"> • رنگ پریدگی • سرخی بیش از حد • زردی • سیانوز لب ها • ادم

ارزیابی شیرخوار در اولین معاینه:

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه ها	طبقه بندی کنید	گوش	دهان و بینی	سروگردان
در صورت مشاهده هر یک از نشانه ها سریعاً به مرکز تخصصی ارجاع نماید	مشکل جدی (۱)	<ul style="list-style-type: none"> • شکاف کام بزرگ • آترزی کوآن دو طرفه • شکم اسکافوئید • گاسترو شریس • امفالوسل • خونریزی ناف • عدم دفع ادرار در ۲۴ ساعت اول • عدم دفع مدفع در ۸ ساعت اول • مقعدبسته 		<ul style="list-style-type: none"> • شکل غیرطبیعی (شکاف ها) • محل قرارگیری غیرطبیعی • فیستول 	<ul style="list-style-type: none"> • بسته بودن سوراخ بینی • اندازه غیرطبیعی فک • اندازه غیرطبیعی زبان 	<ul style="list-style-type: none"> • شکل غیرطبیعی • اندازه غیرطبیعی فونتاتل ها • تورم • توده • فیستول گردن • پرده گردانی
در اولین فرصت به متخصص مربوطه ارجاع دهید	مشکل جدی احتمالی (۲)	<ul style="list-style-type: none"> • شکل و اندازه غیرطبیعی ارگان ها • توده یا تورم • فیستول یا سینوس • محل قرارگیری غیرطبیعی گوش • عرق نافی غیرطبیعی • وجود توده مو • در رفتگی مادرزادی لگن • مجرای ادرار غیرطبیعی • جریان ادرار غیرطبیعی • ابهام تناسلی • عدم نزول بیضه ها • اندازه غیرطبیعی آلت 		<ul style="list-style-type: none"> • شکل غیرطبیعی اندام ها • در رفتگی مادرزادی لگن 	<ul style="list-style-type: none"> • شکل غیرطبیعی • توده • سینوس ها • وجود توده مو 	<ul style="list-style-type: none"> • ساختمان عضلانی غیرطبیعی • شکل اسکافوئید شکم • خونریزی ناف
مادراتشویق کنید که در مراقبتهای بعدی مراجعت کند	مشکل جدی ندارد (۳)	<ul style="list-style-type: none"> • هیچکدام از نشانه های فوق را نداشته باشد 		<ul style="list-style-type: none"> • مقعدبسته • عدم دفع مدفع در ۸ ساعت اول • فیستول 	<ul style="list-style-type: none"> • ابهام تناسلی • عدم نزول بیضه ها • اندازه غیرطبیعی • عدم دفع ادرار در ۲۴ ساعت اول • آلت (penis) 	<ul style="list-style-type: none"> • مجرای ادرار غیرطبیعی • جریان ادرار غیرطبیعی • اندازه غیرطبیعی آلت

ارزیابی کودک از نظر زردی (شیرخوار زیر ۲ماه)

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه ها
در صوت امکان آزمایش بیلیروین انجام دهد و براساس نتیجه آزمایش مطابق جدول راهنمای اقدام نمایید در غیراین صورت شیرخوار را فوراً به بیمارستان ارجاع دهید	زردی شدید (۱)	<ul style="list-style-type: none"> سابقه زردی خطرناک در فرزندان قبلی یا گسترش زردی پائین ترازشکم یا وزن زمان تولداو کمتر از ۲۵۰۰ گرم یا سن حاملگی کمتر از ۳۷ هفته یا مادر Rh منفی
» به مادر توصیه کنید به دفعات بیشتر و مدت طولانی تر کودک را شیر بدهد » بعدازیک روز پیگیری کنید	زردی خفیف (۲)	<ul style="list-style-type: none"> هیچکدام از نشانه های زردی شدید را نداشته باشد
» مادر را به شیردادن مکرر تشویق نمایید	زردی ندارد (۳)	<ul style="list-style-type: none"> سفیدی چشم و نوک بینی زرد نباشد

قبل از ۱۴ روزگی

طبقه بندی
کنید

بعد از ۱۴ روزگی

به سفیدی چشم و نوک بینی شیرخوار نگاه کنید

اگر شیرخوار زردی دارد:

مشاهده کنید	سوال کنید
<ul style="list-style-type: none"> به گسترش زردی در سطح بدن توجه کنید 	<ul style="list-style-type: none"> برای چه مدت؟ آیا مادر Rh منفی است؟ آیا سابقه زردی خطرناک* در فرزندان قبلی وجود داشته است؟ آیا سن حاملگی کمتر از ۳۷ هفته می باشد؟ آیا وزن زمان تولداو کمتر از ۲۵۰۰ گرم می باشد؟

در صوت امکان آزمایش بیلیروین، تیروئید انجام دهد و در صورت غیر طبیعی بودن نتیجه آزمایش به متخصص کودکان ارجاع دهید	زردی طولانی مدت (۴)	<ul style="list-style-type: none"> ادامه زردی بیش از ۱۴ روز
--	---------------------------	--

* زردی خطرناک: زردی منجر به فوت یا عقب ماندگی ذهنی و یا نیاز به تعویض خون

ارزیابی کودک از نظر وضعیت وزن

آیا منحنی رشد کودک قبل از سم شده است؟

اگر بلی :

پس از رسم وزن کودک در کارت رشد با وزن قبلی او مقدار یسه کنید.

طبقه بندی
کنید

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه ها
» براساس مقدار انحراف معیار(SD) وزن به قد یا درصد آن ، ارزیابی و درمان مناسب براساس چارت مانا را انجام دهید	سوء تغذیه شدید یا کم وزنی شدید (۱)	• زیر منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار)
» برای اختلال رشد کودک زیر ۲ ماه ۱۰ روز، ۲ ماه تا یک سال ۲ هفته و بالای یک سال یکماه بعد پیگیری کنید.	اختلال رشد دارد (۲)	• بالای منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار) ولی موازی و صعودی نبودن با منحنی رشد
» مادر را تشویق کنید که تغذیه کودکش را همچنان ادامه بدهد	اختلال رشد ندارد (۳)	• بالای منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار) و موازی و صعودی با منحنی رشد

» براساس مقدار انحراف معیار(SD) وزن به قد یا درصد آن ، ارزیابی و درمان مناسب براساس چارت مانا را انجام دهید	سوء تغذیه شدید یا کم وزنی شدید (۱)	• زیر منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار)
» برای اختلال رشد کودک زیر ۲ ماه ۱۰ روز، ۲ ماه تا یک سال ۲ هفته و بالای یک سال یکماه بعد پیگیری کنید.	رشد نامعلوم (۴)	• بالای منحنی قرمز(۳- انحراف معیار)

اگر خیر :

- وزن کودک برای سن را در کارت پایش رشد رسم کنید.

طبقه بندی
کنید

ارزیابی کودک از نظر وضعیت قد:

آیا منحنی رشدقدی کودک قبل از ساخته است؟

اگربلی :

پس از رسماً قدکوک کودک با قد قبلی او مقایسه کنید

طبقه بندی کنید

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه
براساس مقدار انحراف معیار(SD) وزن به قد یا درصد آن، ارزیابی و درمان مناسب براساس چارت مانا را انجام دهید	کوتاه قدی شديد (۱)	• زیر منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار)
برای اختلال رشد کودک زیردو سال ۳ ماه و بالای دو سال ۶ ماه بعد پیگیری کنید.	رشد قدی نامطلوب (۲)	• بالای منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار) ولی موازی و صعودی نبودن بامنحنی قد
مادر را تشویق کنید که تغذیه کودکش را همچنان ادامه بدهد.	رشد قدی مطلوب (۳)	• بالای منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار) و موازی و صعودی بامنحنی قد

براساس مقدار انحراف معیار(SD) وزن به قد یا درصد آن، ارزیابی و درمان مناسب براساس چارت مانا را انجام دهید	کوتاه قدی شديد (۱)	• زیر منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار)
برای اختلال رشد کودک زیردو سال ۳ ماه و بالای دو سال ۶ ماه بعد پیگیری کنید	رشد قدی نامعلوم (۴)	• بالای منحنی قرمز(۳)- انحراف معیار)

اگر خیر :


قدکوک را روی منحنی قد به سن رسماً کنید

طبقه بندی کنید


ارزیابی کودک از نظر وضعیت دورسر(شیرخوار زیر۱۸ماه)

آیامنحی دورسر کودک قبل رسم شده است؟

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه
﴿باتوجه به دورسر والدین، کودک را از نظر ماکروسفالی یا میکروسفالی بررسی کنید	دورسر غیر طبیعی (۱)	<ul style="list-style-type: none"> • زیر منحنی قرمز(۳- انحراف معیار) یا ۹۷ بالای صدک
﴿کودک زیر ۶ ماه را، دوهفته و بالای ۶ ماه را یک ماه بعد پیگیری کنید	دورسر نامطلوب (۲)	<ul style="list-style-type: none"> • بالای منحنی قرمز و زیر صدک ۹۷ و موازی نبودن با منحنی دور سر
﴿مادر را تشویق کنید که مراقبتهای بعدی را انجام دهد	دورسر طبیعی (۳)	<ul style="list-style-type: none"> • بالای منحنی قرمز و زیر صدک ۹۷ و موازی بودن با منحنی دور سر



﴿باتوجه به دورسر والدین، کودک را از نظر ماکروسفالی یا میکروسفالی بررسی کنید	دورسر غیر طبیعی (۱)	<ul style="list-style-type: none"> • زیر منحنی قرمز(۳- انحراف معیار) یا ۹۷ بالای صدک • بالای منحنی قرمز و زیر صدک ۹۷ و موازی نبودن با منحنی دور سر
﴿کودک زیر ۶ ماه را، دوهفته و بالای ۶ ماه را یکماه بعد پیگیری کنید	دورسر نامعلوم (۲)	<ul style="list-style-type: none"> • بالای منحنی قرمز و زیر صدک ۹۷ و موازی بودن با منحنی دور سر



ارزیابی کودک ازنظر وضعیت تغذیه:

چوابهای مادر را با توصیه های تغذیه ای برای گروههای سنی طبق جدول زیر مقایسه کنید.

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه ها	طبقه بندی کنید
» براساس چارت مانا ارزیابی و درمان کنید	احتمال عفونت باکتریال # (۱)	<ul style="list-style-type: none"> قادر به شیرخوردن نیست یا به هیچ وجه پستان را نمی گیرد یا نمی تواند بمکد 	
» توصیه های مشاوره با مادر در مورد مشکلات تغذیه ای (صفحه ۱۵) را انجام دهید	مشکلات تغذیه ای دارد # (۲)	<ul style="list-style-type: none"> مطابقت با توصیه های تغذیه ای ندارد یا خوب پستان نمی گیرد یا خوب نمی مکد یا وجود برفک یا اختلال رشد دارد 	
» اگر خوب پستان نمی گیرد یا خوب نمی مکد طرز صحیح آغوش گرفتن و روی پستان قرار دادن (صفحه ۱۵) را به مادر آموزش دهید. » اگر برفک دارد درمان در منزل را به مادر آموزش دهید » بعد از ۵ روز پیگیری کنید.	مشکلات تغذیه ای ندارد # (۳)	<ul style="list-style-type: none"> مطابقت با توصیه های تغذیه ای دارد 	

سئوال کنید:

• آیا کودک شیر خودتان را می خورد؟

اگر بلی: چند بار در روز؟ آیا در طول شب هم شیر می دهد؟

• آیا کودک غذا یا مایعات دیگر می خورد؟

اگر بلی: چه نوع غذا یا مایعات؟ چند بار در روز؟

کودک بالای ۴ ماه :

اگر اختلال رشد دارد: چه مقدار غذا برای هر وعده به او می دهد؟ چه کسی و چگونه او را تغذیه می کنید؟

کودک زیر ۴ ماه اگر:

مشکل شیرخوردن دارد،

کمتر از ۸ بار در ۲۴ ساعت شیرمی خورد

چیزی دیگری می خورد یا آشامد

اختلال رشد دارد

ارزیابی تغذیه با شیر مادر:

اگر کودک در ساعت گذشته شیر نخوردده است، از مادر بخواهید از این برا ۴ دقیقه اور امشاهده کنید در غیر این صورت از مادر بخواهید اگر امکان دارد صبر کنند موقع شیرخوردن بعدی به شما اطلاع دهد).

آیا شیرخوار قادر به گرفتن پستان می باشد؟

نحوه گرفتن پستان:

- چانه به پستان چسبیده خوب پستان می گیرد
- دهان باز است خوب پستان نمی گیرد
- لب پایین به بیرون برگشته است به هیچ وجه پستان را نمی گیرد
- نوک و قسمت بیشتری از هاله پستان در دهان شیرخوار است

در صورت مشاهده تمامی نشانه های فوق در قسمت خوب پستان می گیرد علامت بزند.

• آیا شیرخوار می تواند خوب بمکد؟

خوب می مکد / خوب نمی مکد / نمی تواند بمکد

بینی شیرخوار را الگرمانع تغذیه او سنت تمیز کنید.

• از نظر برفک، دهان را مشاهده کنید.

توصیه های تغذیه ای

۲ سال و بیشتر	۱۲ ماه تا ۲ سال	۶ ماه تا ۱۲ ماهگی	۴ تا ۶ ماهگی	تا ۴ ماهگی
<ul style="list-style-type: none"> دادن غذاهای خانواده حداقل ۳۰ عدد در روز. همچنین، دوبار روزانه میان وعده‌های غذائی داده شود: 	<ul style="list-style-type: none"> هر چقدر کودک میل دارد او را با شیرمادر تغذیه کنید. دادن غذاهای کافی: 	<ul style="list-style-type: none"> هر چقدر کودک میل دارد او را با شیرمادر تغذیه کنید. دادن غذاهای کافی: 	<ul style="list-style-type: none"> هر چقدر کودک میل دارد شیرمادر بخورد، روز و شب حداقل ۸ بار در ۲۴ ساعت، اگر کودک اضافه وزن مناسب نداشته باشد - تعداد دفعات شیردهی را فزایش دهید. - بعد از تغذیه با شیرمادر، غذای کمکی به میزان یک یا دو قاشق مر باخوری به او بدهیدیا - ۱ تا ۲ بار در روز بعد از تغذیه با شیر مادر غذاهای کمکی به او بدهید. 	<ul style="list-style-type: none"> هر چقدر کودک میل دارد شیرمادر بخورد، روز و شب، حداقل ۸ بار در ۲۴ ساعت • هیچ غذا یا مایعات دیگری به او ندهید.

ارزیابی کودک از نظر وضعیت دهان و دندان:(بالای ۲ سالگی)

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه ها
<ul style="list-style-type: none"> ﴿ اقدامات مربوط به بیرون افتادن کامل دندان را انجام دهید ﴿ اگر درد دارد استامینوفن بدھید ﴿ در اسرع وقت کودک را برای ارزیابی بیشتر به دندانپزشک ارجاع دهید 	مشکل دندانی شديد (۱)	<ul style="list-style-type: none"> درد یا بیرون افتادن کامل دندان از دهان یا تورم و قرمزی لثه ها یا تورم صورت یا پوسیدگی دندانها(بیش از ۱۰ دندان یا سندرم شیشه شیر)
<ul style="list-style-type: none"> ﴿ روشهای صحیح مسوак زدن را به مادر آموخت دهید ﴿ توصیه های بهداشت دهان و دندان را به والدین آموخت دهید ﴿ در اولین فرصت برای ارزیابی بیشتر به دندانپزشک مراجعه کند 	مشکل دندانی دارد (۲)	<ul style="list-style-type: none"> پوسیدگی دندان ها(کمتر از ۱۰ دندان) تاخیر در رویش مکینه های غیر تغذیه ای (بعد از ۴ سالگی) سابقه ضربه به دندان
<ul style="list-style-type: none"> ﴿ اگر کمتر از ۲ بار مسوак می زند یا والدین در مسواك زدن برای کودک همکاری نمی کنند روشاهای صحیح مسواك زدن را به مادر آموخت دهید و روز بعد مراجعاً گردند ﴿ توصیه های بهداشت دهان و دندان را به والدین آموخت دهید و آنها را برای انجام معاینات دوره ای * توسط دندانپزشک/بهداشت کاردهان و دندان الزام نمایید. ﴿ والدین را تشویق کنید که در مراقبتهای بعدی مراجعه کند 	مشکل دندانی ندارد (۳)	<ul style="list-style-type: none"> اگر والدین در مسواك زدن برای کودک همکاری نمی کنند یا کودک کمتر از دو بار مسواك می زند یا هیچیک از نشانه های فوق را ندارد

سؤال کنید:	نگاه کنید:
آیا والدین در مسواك زدن به کودک کمک می نمایند؟	• پوسیدگی دندان ها یا سندرم شیشه شیر
آیا کودک به تنها یا با همکاری والدین بار در روز مسواك می کند؟	• تاخیر رویش *
آیا کودک شما سابقه ضربه به دندانها دارد؟	• تورم و قرمزی لثه ها
آیا کودک دندان درد دارد؟	• تورم صورت
بعد از ۵ سالگی: آیا کودک شما عادات غلط دهانی(مثل مکیدن انگشت شست، پستانک، ...) دارد؟	• پوسیدگی دندان ها (کمتر از ۱۰ دندان)

دندان شیری	فک بالا	دندان دائمی	فک بالا	دندان شیری
پیش میانی	۱۰ سالگی	پیش میانی	۱۷ ماهگی	۱۹ ماهگی
پیش طرفی	۱۱ سالگی	پیش طرفی	۲۲ ماهگی	۲۰ ماهگی
نیش	۱۲ سالگی	نیش	۲۹ ماهگی	۲۸ ماهگی
آسیای اول	۱۳ سالگی	اولین آسیای کوچک	۲۵ ماهگی	۲۴ ماهگی
آسیای دوم	۱۴ سالگی	دومین آسیای کوچک	۳۷ ماهگی	۲۵ ماهگی
	۹ سالگی	اولین آسیای بزرک		
	۱۵ سالگی	دومین آسیای بزرک		

ارزیابی کودک از نظر وضعیت بینایی:

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه ها
• کودک را برای ارزیابی بیشتر به متخصص چشم ارجاع دهید	مشکل بینایی دارد (۱)	<ul style="list-style-type: none"> در صورت پاسخ منفی در هرگروه سنی یا ظاهريات حرکات غير طبیعی چشم Red reflex عدم قدرت بینایی کمتر از <u>۷</u> <u>۱۰</u>
• در مورد رابطه متقابل کودک و والدین مشاوره کنید	مشکل بینایی ندارد (۲)	<p>هیچک از نشانه های فوق را ندارد</p>

طبقه بندی
کنید

جوابهای مادر را با جدول بینایی برای گروههای سنی مقایسه کنید		
سن	سئوال کنید:	نگاه کنید:
تا ۲ ماهگی	<ul style="list-style-type: none"> آیا به صورت شما نگاه می کند؟ آیا چشم هایش را در مقابل نور می بندد؟ 	• ظاهر چشم Red reflex • حرکات چشم
تا ۶ ماهگی	<ul style="list-style-type: none"> آیا به اطراف با توجه نگاه می کند؟ آیا برای گرفتن اشیاء واکنش نشان می دهد؟ 	
تا ۹ ماهگی	<ul style="list-style-type: none"> آیا چشم ها با هم دیگر هماهنگ حرکت می کند؟ آیا سباب بازی خیلی کوچک را می تواند حرکت دهد؟ 	
تا ۱۲ ماهگی	<ul style="list-style-type: none"> آیا به اشیاء موردن لخواهش اشاره می کند؟ آیا افراد را قبل از صحبت کردن در موقع داخل شدن به اتاق می شناسد؟ 	
تا ۶ سالگی	<ul style="list-style-type: none"> آیا هیچ نگرانی درباره نحوه دیدن کودک خود دارد؟ 	• ظاهر حرکات چشم • تست قدرت بینایی بعده از سالگی

ارزیابی کودک ازنظر وضعیت تکامل

جوابهای مادر را با جدول تکامل برای گروههای سنی مقایسه کنید.

تصویه ها	طبقه بندی	نشانه ها	
» کودک را برای ارزیابی بیشتر به متخصص نورولوژی کودکان ارجاع دهد.	مشکل تکاملی شدید (۱)	<ul style="list-style-type: none"> ۲ یابیشتر از نگرانی های کلیدی* را دارد 	طبقه بندی کنید
» از کودک تست Denver یا ASQ انجام دهید و بر اساس آن تصمیم گیری کنید.	مشکل تکاملی نامعلوم (۲)	<ul style="list-style-type: none"> • یکی از نگرانی های کلیدی را دارد یا • یا بیشتر از نگرانی های غیر کلیدی را دارد یا • مشکل در برقراری ارتباط با والدین 	
» اگریکی از نگرانی های غیر کلیدی را دارد به مادر توصیه کنید که توجه کامل به این نگرانی داشته باشد و ۲ هفته دیگر مراجعت کند. » در غیر این صورت: » با مادر در مرور رابطه متقابل کودک و والدین مشاوره کنید	مشکل تکاملی ندارد (۳)	<ul style="list-style-type: none"> هیچیک از نگرانی های کلیدی را دارد یا یکی از نگرانی های غیر کلیدی را دارد 	

سؤال کنید:

۱. آیا رفتار کودک شمامتل سایر کودکان هم سن خود می باشد؟
۲. آیا هیچ نگرانی درباره نحوه حرف زدن کودک خود دارید؟
۳. آیا هیچ نگرانی درباره نحوه فهمیدن چیزهای که به او می گوید دارید؟
۴. آیا هیچ نگرانی درباره نحوه استفاده از دست ها و انگشتانش دارید؟
۵. آیا هیچ نگرانی درباره نحوه استفاده از پاها و بازو هایش دارید؟

برای کودکان ۵ ساله و بالاتر سوال کنید:

۶. آیا هیچ نگرانی درباره یادگیری انجام دادن کارها مانند سایر کودکان همسن خود دارید؟
۷. آیا هیچ نگرانی درباره یادگیری مهارت های پیش از دبستانی و دبستانی کودک خود دارید؟

* نگرانی های کلیدی با رنگ قرمز در جدول تکامل مشخص شده است

جدول تکامل کودکان ۱/۵ ماهگی تا ۲۴ ماهگی

۲۴ ماهگی	۱۸ ماهگی	۱۵ ماهگی	۱۲ ماهگی	۹ ماهگی	۶ ماهگی	۴ ماهگی	۲ ماهگی	تا ۳۰ روزگی	
۰ درآوردن (جلیقه) لباس	۰ نوشیدن از استکان به تنهايی	۰ توپ بازي	۰ دست دستی کردن	۰ خودش غذا می خورد	۰ تلاش برای گرفتن اسباب بازي	۰ توجه به دستهایش	۰ لبخند زدن	۰ توجه به صورت	۱
۰ ترکیب کلمات	۰ حداقل ۲ کلمه	۰ حداقل یک یادوکلمه	۰ بابا و ماما مفهوم	۰ بابا و ماما نامفهوم	۰ تقلید صدای "او"	۰ جیغ کشیدن	۰ درآوردن صدای آرام	۰ درآوردن صدای آرام	۲
۰ نشان دادن ۶ قسمت بدن	۰ فهمیدن صحبت با او	۰ فهمیدن بعضی از صحبت هایی که به او می گویند	۰ پاسخ به اسمش یا کلمات آشنا	۰ گوش کردن با دقت به صدای آشنا	۰ برگشتن به طرف صداها	۰ توجه به صدای جفجه	۰ آرام شدن با صدای مادر	۰ پاسخ به صدای زنگ	۳
۰ بازکردن دکمه لباس	۰ ورق زدن صفحات کتاب به تنهايی	۰ خط خطی کردن	۰ انداختن اشیاء دراستکان	۰ برداشت اشیای کوچک	۰ رسانیدن دست به چیزی	۰ رسانیدن دست به همیگر گرفتن جفجه	۰ عدم نگرانی در مورد استفاده از دست و انگشتان	۰ عدم نگرانی در مورد استفاده از دست و انگشتان	۴
۰ از پله بالارفتن	۰ دویدن	۰ خوب راه رفتن	۰ ایستادن بمدت چند ثانیه	۰ نشستن بدون کمک	۰ غلت زدن	۰ ثابت نگه داشتن سر در حالت نشسته	۰ بلند کردن سر تا ۴۵ درجه	۰ بالآوردن لحظه ای سر در حالتی که شیر خواربروی شکم خوابیده حرکات اندام ها	۵

جدول تکامل کودکان ۳ تا ۸ ساله

۸ سالگی	۷ سالگی	۶ سالگی	۵ سالگی	۴ سالگی	۳ سالگی	
رفتار کودک مثل همسالان	۰ شیرین کردن چای	۰ مسوак زدن بدون کمک	۰ پوشیدن لباس بدون کمک	۰ شستن و خشک کردن دست ها	۱	
عدم نگرانی از نحوه حرف زدن	۰ شمارش ۵ شیء	۰ نام بردن ۴ رنگ	۰ مفهوم بودن تمام صحبت هایش	۰ مفهوم بودن نیمی از صحبت هایش	۲	
عدم نگرانی از نحوه فهمیدن چیزهایی که به او می گویید	۰ شناخت متضاد ۲ مورد(شب، روز)	۰ شناخت خط بلندتر	۰ شناخت استفاده از ۳ شیء (فنجان، صندلی، مداد)	۰ نشان دادن حداقل ۴ تصویر(سگ، گربه، اسب، پرنده، آدم)	۳	
عدم نگرانی از نحوه استفاده از دست ها و انگشتان	۰ کشیدن مربع از روی آن	۰ کشیدن بعلاوه (+) از روی آن	۰ کشیدن دایره از روی آن	۰ تقلید خط عمودی	۴	
عدم نگرانی از نحوه استفاده از پاها و بازو هایش	۰ ایستادن ۶ ثانیه روی یک پا	۰ ایستادن ۴ ثانیه روی یک پا	۰ ایستادن ۲ ثانیه روی یک پا	۰ بالاپریدن	۵	
یادگیری انجام دادن کارها مثل همسالان					۶	
یادگیری مهارت های دبستانی	یادگیری مهارت های پیش دبستانی				۷	

ارزیابی کودک از نظر وضعیت واکسیناسیون :

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه
<ul style="list-style-type: none"> کودک رامطابق دستورالعمل کشوری ایمن سازی ، واکسینه نماید. توصیه های پیشگیری از حوادث و سوانح در منزل را به مادر بگویید. 	واکسیناسیون ناقص (۱)	<ul style="list-style-type: none"> در صورت پاسخ منفی در هرگروه سنی
<ul style="list-style-type: none"> مادر را تشویق کنید که در مراقبتهای بعدی مراجعه کند توصیه های پیشگیری از حوادث و سوانح در منزل را به مادر بگویید. 	واکسیناسیون کامل (۲)	<ul style="list-style-type: none"> مطابقت با جدول واکسیناسیون دارد

طبقه
بندی
کنید

جوابهای مادر را با جدول واکسیناسیون برای گروههای سنی مقایسه کنید						
• فوج اطفال • سه گانه MMR •	۴-۶ سالگی	• سه گانه • هپاتیت ب	۶ ماهگی	• هپاتیت ب • فوج اطفال • سه گانه	۰-۶ تولد	• هپاتیت ب • فوج اطفال • سه گانه
• فوج اطفال • سه گانه	۱۲ ماهگی	• هپاتیت ب • فوج اطفال • سه گانه	۰-۶ ۲ ماهگی	• هپاتیت ب • فوج اطفال • سه گانه	۰-۶ ۴ ماهگی	• هپاتیت ب • فوج اطفال • سه گانه
• فوج اطفال • سه گانه	۱۸ ماهگی	• هپاتیت ب • فوج اطفال • سه گانه	۰-۶ ۴ ماهگی	• هپاتیت ب • فوج اطفال • سه گانه	۰-۶ ۶ ماهگی	• هپاتیت ب • فوج اطفال • سه گانه

ارزیابی کودک از نظر وضعیت مکمل های دارویی :

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه
<ul style="list-style-type: none"> به مادر توصیه کنید مکمل های دارویی را مصرف نماید. مادر را تشویق کنید که در مراقبتهای بعدی مراجعه کند توصیه های پیشگیری از حوادث و سوانح در منزل را به مادر بگویید. 	مصرف ناقص مکمل دارویی (۱) مصرف کامل مکمل دارویی (۲)	<ul style="list-style-type: none"> مطابقت با جدول مکمل های دارویی ندارد مطابقت با جدول مکمل های دارویی دارد

طبقه بندی کنید

• قطره مولتی ویتامین یا A+D یکسال	۱۵ روزگی تا ۲ سال
• قطره آهن	۶ ماهگی تا ۲ سال

ارزیابی کودک از نظر وضعیت آزمایش ها :

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه
<ul style="list-style-type: none"> برای ارزیابی بیشتر یا درخواست آزمایش به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید. 	آزمایش غیرطبیعی (۱)	<ul style="list-style-type: none"> آزمایش غیرطبیعی است عدم مطابقت با جدول آزمایش ها
<ul style="list-style-type: none"> به مادر اطمینان دهید که از نظر آزمایش مورد نظر مشکلی ندارد. 	آزمایش طبیعی (۲)	<ul style="list-style-type: none"> آزمایش ها مطابق با جدول و طبیعی است

طبقه بندی کنید

• آزمایش تیروئید	تا ۵ روزگی
• آزمایش کم خونی	۶ تا ۹ ماهگی
• آزمایش ادرار	یک سالگی
• چربی خون*	سه سالگی

* کودکان در معرف خطر

مشاوره با مادر در مورد مشکلات تغذیه ای:

﴿ اگر کودک زیر ۴ ماه سن دارد و شیر و یا غذای دیگری می خورد :

- به مادر اطمینان بدهید که خود می تواند شیر مورد نیاز کودکش را تولید کند.
- توصیه کنید مرتب ، روز و شب و با دفعات طولانی کودک را شیر بدهد و بتدریج غذاها و شیرهای دیگر را کند.

اگر مادر مجبور است شیرهای دیگر را به کودک بدهد درخصوص موارد زیر با او مشاوره کنید:

- تغذیه با شیر مادر را حتی شب ها ادامه دهد .
- مطمئن شوید جانشین شونده مناسبی انتخاب کرده
- مطمئن شوید طرز تهیه شیررا می داند و آن را بهداشتی تهیه می کند.
- شیر آماده را بیشتر از یک ساعت نگه ندارد.
- از گل زنک استفاده نکند.

﴿ اگر مادر برای تغذیه کودک از بطری استفاده می کند :

- به جای بطری فنجان را توصیه کنید.
- به مادر نشان بدهید که چگونه با فنجان به کودک شیر بدهد .

﴿ اگر کودک خوب غذا نمی خورد با مادر مشاوره کنید:

- با کودک بنشینید و او را ترغیب نمایید.
- به کودک در ظرفها و کاسه های جدا غذا بدهید.
- از غذاهای نرم، متنوع ، اشتها آور و غذاهایی که کودک دوست دارد تا حد امکان به او بدهید.

نحوه صحیح بغل کردن و پستان گرفتن شیرخوار :

- ﴿ نشان بدهید که چگونه کودک را نگه دارد
- بدن و سرکودک در امتداد هم باشد
- صورت کودک مقابل پستان باشد
- بدن کودک نزدیک بدن او باشد
- تمام بدن کودک (نه فقط گردن و شانه او را) را با دست حمایت کند
- ﴿ به مادر نشان بدهید که چگونه کودک را به پستان بگذارد
- لب کودک با نوک پستان تماس داشته باشد
- صبر کند تا کودک دهانش را خوب باز کند
- نوک و قسمت بیشتری از هاله پستان در دهان شیرخوار باشد.

﴿ درمان برفک

﴿ مادر باید:

- دستهایش را بشوید.
- پنبه تمیز را به چوب کبریت پیچیده (ویا یک گوش پاک کن را) با ۱ میلی لیتر محلول نیستاتین آغشته کندور روی لکه های سفید (برفک) داخل دهان شیرخوار بمالدواین عمل راه راه ۶ ساعت یکبار تکرار کند.
- دارو به نوک و هاله پستان مادر هم مالیده شود.

آموزش و مشاوره با مادر - پیشگیری از حوادث و سوانح در کودکان

عنوان	زیر ۴ ماه	۴ تا ۶ ماهگی	۷ تا ۱۱ ماهگی
سوختگی	<ul style="list-style-type: none"> در زمان بغل کودکان مایعات داغ و چای نوشیدو سیگار نکشید. کودک را در معرض مایعات داغ و سایل سوزاننده (از قبیل سماور، بخاری، اجاق، کرسی، منقل، تنور، اتو و ...) قرار ندهید. پیش از حمام کودکان دمای آب را با پشت دست خود امتحان کنید تا مطمئن شوید که آب ولرم باشد. 	<ul style="list-style-type: none"> اشیای سنگین یا ظرف های حاوی مایعات داغ را روی میز نگذارید در پریزهای برق، محافظ پلاستیکی قرار دهید 	<ul style="list-style-type: none"> پیش از حمام کردن کودکان دمای آب را با پشت دست خود امتحان کنید
سقوط	<ul style="list-style-type: none"> هرگز کودکان را وقتی محافظ گهواره یا تخت خواب بازیابی نکنید. هرگز کودک خود را در جاهای بلند مانند میز، تخت خواب بدون حفاظ، نیمکت و صندلی، تنها رها نکنید. ساک حمل شیرخوار را از زیر بگیرید 	<ul style="list-style-type: none"> در هیچ سن و سالی کودک را در روروک نگذارید محافظ در ابتدا و انتهای راه پله ها قرار دهید کودک خود در جاهای بلند، بدون محافظ تنها رها نکنید 	<ul style="list-style-type: none"> کودک خود در جاهای بلند مانند میز، تخت خواب بدون حفاظ، نیمکت و صندلی، تنها رها نکنید
غرق شدگی و خفگی	<ul style="list-style-type: none"> هرگز کودک خود را در تشت آب یا وان، تنها رها نکنید. همیشه با یک دست از آنها حفاظت کنید اشیای کوچک یا نوک تیزرا دوراز دسترس کودکان قرار دهید کودک را به پشت یا به پهلو بخوابانید (به شکم نخوابانید) شیرخوار را قنداق نکنید، شکم کودک را محکم نبندید، از بالا استفاده نکنید محیط زندگی کودکان را عاری از دود (سماور-وال-منقل و ...) نکه دارید. کمک های اولیه و احیای قلبی عروقی شیرخوار ایاموزید 	<ul style="list-style-type: none"> سطل ها، تشت ها و حوضچه ها را خالی نگهدارید استخرها را از چهار طرف حفاظ دار کنید و در ورودی آنها بسته نگهدارید کیسه های پلاستیکی یا بادکشها را نزدیک کودک قرار ندهید سیم تلفن، سیم های الکتریکی، نوارهای پرده و کرکره را از نزدیک تحت خواب کودکان یا محل بازی اودور نکنید اشیاء کوچک یا نوک تیزرا دور از دسترس کودک قرار دهید 	<ul style="list-style-type: none"> استخرها را از چهار طرف حفاظ دار کنید و در آنها بسته نگهدارید آنها را از چهار طرف حفاظ دار کنید و در ورودی آنها بسته نگهدارید کیسه های پلاستیکی یا بادکشها را نزدیک کودک قرار دهید سیم تلفن، سیم های الکتریکی، نوارهای پرده و کرکره را از نزدیک تحت خواب کودکان یا محل بازی اودور نکنید اشیاء کوچک یا نوک تیزرا دور از دسترس کودک قرار دهید
سمومیت		<ul style="list-style-type: none"> درب کابینت و کمد توسط کودک قابل باز کردن نباشد. مواد شیمیایی (شوینده، پاک کننده، سموم) و داروها را دور از دسترس کودکان قرار دهید. مواد سمی (نفت یا مواد شوینده) را در ظروف مخصوص ریخته و دور از دسترس کودکان قرار دهید 	<ul style="list-style-type: none"> اشیاء خطرناک و آلوده، روی سطح زمین و در معرض دید کودک قرار ندهید مواد شیمیایی (شوینده، پاک کننده، سموم) و داروها را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
حوادث ترافیکی	<ul style="list-style-type: none"> بهتر است حمل و نقل کودک با وسیله نقیه اینم در بغل مراقبین باشد و وسائل اینم از قبیل بستن کمر بند اینمی و پوشش مناسب را رعایت کنید صندلی عقب اتوموبیل اینم ترین محل برای کودکان در هنگام رانندگی است از صندلی مخصوص کودک در اتوموبیل استفاده کنید 	<ul style="list-style-type: none"> از صندلی مخصوص کودک در اتوموبیل استفاده کنید صندلی عقب اتوموبیل اینم ترین محل برای کودکان در هنگام رانندگی است از صندلی مخصوص کودک در اتوموبیل استفاده کنید 	<ul style="list-style-type: none"> از صندلی مخصوص کودک در اتوموبیل استفاده کنید صندلی عقب اتوموبیل اینم ترین محل برای کودکان در هنگام رانندگی است از صندلی مخصوص کودک در اتوموبیل استفاده کنید

مصاحبه و مشاوره با مادر- پیشگیری از حوادث و سوانح در کودکان

عنوان	۱سالگی	۲سالگی	۳سالگی	۴سالگی	۵و ۶سالگی
سوختگی	• ظروف خوراک پزی و مایعات داغ را دور از دسترس کودکان قرار دهید	• ظروف خوراک پزی و مایعات داغ را دور از دسترس کودکان قرار دهید	• ظروف خوراک پزی و مایعات داغ را دور از دسترس کودکان قرار دهید	• ظروف خوراک پزی و مایعات داغ را دور از دسترس کودکان قرار دهید	• قوانین ایمنی دوچرخه سواری را آموخت دهید
سقوط	• روی پنجره ها و پله ها حفاظت قرار دهید	• روی پنجره ها و پله ها حفاظت قرار دهید	• بالا و پایین رفتن از پله را به کودک بیاموزید	• کلاه ایمنی در زمان سه چرخه یا دوچرخه رانی به سرکوک بگذارید	• شناو قوانین ایمنی آب را به کودک آموخت دهید
غرق شدگی و خفگی	• کیسه های پلاستیکی یا بادکنکها را در اختیار کودک قرار ندهید.	• اطراف استخرها و حوضچه ها حفاظت قرار دهید	• اطراف استخرها و حوضچه ها حفاظت قرار دهید	• شناو قوانین ایمنی آب را به کودک آموخت دهید	• مواد مسموم کننده را دور از دید و دسترس کودکتان قرار دهید
مسمو میت	• مواد مسموم کننده را دور از دید و دسترس کودکتان قرار دهید	• مواد مسموم کننده را دور از دید و دسترس کودکتان قرار دهید	• مواد مسموم کننده را دور از دید و دسترس کودکتان قرار دهید	• مواد مسموم کننده را دور از دید و دسترس کودکتان قرار دهید	• از مرابت از کودک دریک محیط ایمن در پیش و پس از مدرسه اطمینان یابید
خدمات بدنی	• کودکان را با حیوانات خانگی تنهان گذارید	• کودکان را تنهار هانکنند	• از محل کودک خود در همه زمان مطلع باشید	• چگونگی ارتباط با غریبه ها را آموخت دهید	• چگونگی ارتباط با غریبه ها را آموخت دهید
حوادث traficki	• از صندلی مخصوص کودک در اتوموبیل استفاده کنید	• از صندلی مخصوص کودک در اتوموبیل استفاده کنید	• صندلی عقب اتوموبیل ایمن ترین محل برای کودکان در هنگام رانندگی است	• مهارت های ایمن گذر از پیاده رو را به کودک بیاموزید	• بر اینه میط های بازی تأکید کنید. • صندلی عقب اتوموبیل ایمن ترین محل برای کودکان در هنگام رانندگی است

مصاحبه و مشاوره با مادر-رابطه مقابله کودک ووالدین

تاریخ	محتوا	تاریخ	محتوا	تاریخ	محتوا	تاریخ	محتوا	تاریخ	محتوا	
۱۸-۲۴ماهگی	ایجادوسایل ارتباط و مشاوره	۱۵-۱۸ماهگی	تحسین به اظهار محبت	۱۲-۱۵ماهگی	شرکت در فعالیت ها	۹-۱۲ماهگی	نشان دادن بخودرهای اجتماعی	۴-۶ماهگی	پاسخ های اغراق آمیز	
<ul style="list-style-type: none"> بازیهای گروهی بکنید و سایل بازی را بین فهم تقسیم کنید هرگونه مشاوره و کارهای سخاونمندانه (دادن مقداری اش) او را تحسین کنید تصییم های اورا به سادگی و بدون نگرانی بینبرید و هرگز در خواست کنید که کش کنند معنی کنید با منحرف کردن حواس اوب طرق مختلف از منفی کاری او جلوگیری کنید 	<ul style="list-style-type: none"> محبت و توجه اورا است به این دیگران (مثل خواهروبران) تحسین کنید اجازه دهد بعضی از لیسایش (جواب، کلام، راهنمایی) را خود پوشید اورا به این داشتن بارگیران عادت دهد کارهای کوچک روزانه را باید آغاز کنید آموزش تشكیل کردن را آغاز کنید هرگز از زور اس تقدا 	<ul style="list-style-type: none"> اورا تا حدام کان در فعالیت ها شرکت دهد و در نزدیکی این مکان به جمع بنشانید اورا افرازیک آشنا کنید و کم ترا بکار برد 	<ul style="list-style-type: none"> درورود به منزل بالا جذابانه سلام و احوالپرسی کنید و هنگام خروج اورا بسیار پرش دست تکان دهد اورا با افرادی که آشنا کنید و کم ترا بکار برد 	<ul style="list-style-type: none"> محبت جسمانی زیاد در هر فرضی کودک را مس و این شمارالمس کند صدای اورا تا قید کنید سپس صدای جدید در آورد و حس بر کنید 	<ul style="list-style-type: none"> واکنش های متنوعی (زیرهوم کردن صدا) نسبت به حرکت و رفتار اشنان دهد همان هارا به این قید کنید تا به تابه تپاسخ دهد 	<ul style="list-style-type: none"> نشویق حرکات جدید در هر کارهای کودک را به صورت افراط آمیز تقلید کنید 	<ul style="list-style-type: none"> حالات و حرکات در بیرون را پیوست داشته باشد به تمام صدای او بالبخند و یا بغل کردن و یا حرکت سربودن خود پاسخ دهد در هنگام کریه اورا بغل کنید و هرگز و صدای او پاسخ مناسب پدید 	برقراری ارتباط عاطفی	۱	
<ul style="list-style-type: none"> هنگامی که چیزی را که دکان شناس می دهد خواص آن را سفی نرمی برند. اینها از راه خود را بینند دستهای طولانی تر پیوچیده تبریز ایشان را بخوانند از اینها سه بعدی که برای قرار دادن شکل های مختلف در شکاف های مخصوص طراحی شود تهیه کنید و بکار برد 	<ul style="list-style-type: none"> پارگیری اورا از اطریق تکار تشویق دستهای کوتاه برای او بخوانند وقتی کاری انجام می دهد بدخشان عبارت کلیدی را باید از تکرار بخوانند 	<ul style="list-style-type: none"> تحريك قوه تحيل تحريك قوه تمكزو تقليد 	<ul style="list-style-type: none"> پارگاهی که بالگشت می توان خود را برای این اشخاص بخواهد کتابهای کوکانه با تصاویر خوش رنگ و بزرگ انتخاب بیک قصه ساده و کوتاه در مردم آن پکویید. 	<ul style="list-style-type: none"> تحريك حس استقلال با غذاهایی که بالگشت می توان خود را برای این اشخاص بخواهد با سیب بازی های با صدای پاوسایل بی خطا شهربانی بازی کنند زیاد با آب بازی کنید و بدهید 	<ul style="list-style-type: none"> تحريك حس خودآگاهی مکررا برای این اشخاص متناسب باشیں و این تصویر کودکان را در آینه به اینشان دهد 	<ul style="list-style-type: none"> تحريك حس خودآگاهی از اینها متناسب باشیں و این در اینجا این اشخاص مانند تکانهای لایی بخوانند، زیاد بخندند اشیاء مختلف را رنگ های روشن و درخشان را در فاصله نزدیک (۲۰ Cm) صورت به او نشان دهند. 	تحريك حواس	۲		
<ul style="list-style-type: none"> ایجادوسایل ارتباط و مشاوره تمرين لباس پوشیدن تمرين تحمل وزن بدن 	<ul style="list-style-type: none"> تمرين حركات چرخشی تمرين راهکردن اشياء تمرين تحمل وزن و زانو 	<ul style="list-style-type: none"> تمرين روی هم چinden اشياء تمرين راهکردن اشياء تمرين تحمل وزن و زانو 	<ul style="list-style-type: none"> تمرين راهکردن اشياء تمرين راهکردن اشياء تمرين راهکردن اشياء 	<ul style="list-style-type: none"> تمرين دادن و گرفتن تمرين دادن و گرفتن تمرين دادن و گرفتن 	<ul style="list-style-type: none"> تمرين دادن و گرفتن تمرين دادن و گرفتن تمرين دادن و گرفتن 	<ul style="list-style-type: none"> اشيای متناسب یک چیزی درستان کودک پکار چون چندبار آنرا تکان دهد اشیاء متفاوتی را به اینشان دهد تا دستش را به طرف آن دراز کند 	<ul style="list-style-type: none"> بازتاب چنگ زدن اجازه دهد اینکشان را بگیرد برای تشویق به شل کردن اینکشان، یکی کی آنها بارگیرد اجازه دهد با اشیاء بازی و مراجعت آنها را کند 	بازتاب چنگ زدن	۳	
<ul style="list-style-type: none"> تمرين راهکردن اشياء تمرين راهکردن اشياء تمرين تحمل وزن بدن 	<ul style="list-style-type: none"> تمرين راهکردن اشياء تمرين راهکردن اشياء تمرين تحمل وزن و زانو 	<ul style="list-style-type: none"> تمرين راهکردن اشياء تمرين راهکردن اشياء تمرين راهکردن اشياء 	<ul style="list-style-type: none"> تمرين راهکردن اشياء تمرين راهکردن اشياء تمرين راهکردن اشياء 	<ul style="list-style-type: none"> تمرين دادن و گرفتن تمرين دادن و گرفتن تمرين دادن و گرفتن 	<ul style="list-style-type: none"> تمرين دادن و گرفتن تمرين دادن و گرفتن تمرين دادن و گرفتن 	<ul style="list-style-type: none"> تمرين دادن و گرفتن تمرين دادن و گرفتن تمرين دادن و گرفتن 	<ul style="list-style-type: none"> تمرين دادن و گرفتن تمرين دادن و گرفتن تمرين دادن و گرفتن 	<ul style="list-style-type: none"> تمرين دادن و گرفتن تمرين دادن و گرفتن تمرين دادن و گرفتن 	تقویت عضلات پشت و گردن	۴

۱

۲

۳

۴

مشاوره با مادر در مورد بهداشت دهان و دندان

اقدامات لازم جهت بیرون افتادن کامل دندان از دهان

- اگر دندان دائمی کامل از دهان بیرون یافتد، بهورز یا والدین می‌توانند تاج دندان را نگه داشته و ریشه را زیر فشار ملایم آب یا آب جوشیده سرد شده بگیرند. در این حالت به هیچ وجه دندان نباید با پارچه یا دست پاک شود.
- سپس باید دندان در یک محیط مرطوب مثل سرم شستشوی نمکی، شیر، آب جوشیده سرد شده، و یا زیر زبان فرد قرار گیرد و بلافضله (در حداقل زمان ممکن) به دندانپزشک ارجاع شود.
- در صورتیکه صدمه در محیطی آلوده اتفاق افتاده و دوره واکسیناسیون کامل نباشد، باید یک نوبت واکسن کراز به بیمار تزریق شود، سپس ارجاع شود.

توصیه های بهداشت دهان و دندان جهت آموزش والدین

- در صورت استفاده از قطره آهن، برای جلوگیری از تغییر رنگ دندانها، قطره آهن را در عقب دهان کودک بچکانید و پس از دادن قطره، به نوزادان شیرخوار شیر و به کودکان بزرگتر آب بدهید.
- حداقل زمان برای مسوак کردن ۴ دقیقه می‌باشد.
- زمانهای مناسب برای مسواك کردن (۲بار در روز): صبح‌ها (بعد از صبحانه)، شبها (قبل از خواب)
- سطوح بین دندانی به هیچ وجه با استفاده از مسواك تمیز نمی‌شوند و تنها با استفاده از نخ دندان می‌توان این سطوح را تمیز کرد. می‌توان پس از سن ۶ سالگی از نخ دندان استفاده کرد.
- علاوه بر مسواك و نخ دندان، استفاده از فلورایید (به صورت دهانشویه، ژل، قرص و...) و فیشور سیلات از مهمترین راههای پیشگیری از پوسیدگی می‌باشد، که بایستی با مشاوره دندانپزشک استفاده شود.
- چون دندانهای شیری راهنمای مناسب جهت رویش جوانه دندانهای دائمی می‌باشد و فضای لازم برای دندانهای دائمی را حفظ می‌کنند، از کشیدن زود هنگام آنها خودداری کنید.

روشهای صحیح مسواك زدن

زیر ۱ سال

- یک تکه گاز تمیز را دور انگشت سبابه پیچیده و لثه بالا و پایین را به آهستگی تمیز نمایید یا در صورت دسترسی به مسواك انگشتی، آنرا روی داخلی و خارجی و جونده دندانها گذارد و شده و با حرکت مالشی به جلو و عقب حرکت داده می‌شود.
- اینکار را دوبار در روز بعد از اولین و آخرین وعده غذایی انجام دهید که روی هم رفته ۲ دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد.

۳-۵ سال

- والد پشت سر کودک طوری قرار می‌گیرد که هر دندان در محل اتصال لثه و دندان قرار داده شود.
- ابتدا با حرکت لرزشی و سپس با حرکت مج دست موهای مسواك روی سطح دندان به طرف سطح جونده چرخانده شود.
- این حرکت حدود ۱۵ تا ۲۰ بار برای هر دندان باید انجام شود.
- برای سطح داخلی دندانهای جلو، مسواك را باید به صورت عمودی بر روی سطح داخلی دندانهای جلو قرار داد و با حرکت بالا و پایین این سطوح را تمیز کرد.

۶ سال به بالا

- موهای مسواك با زاویه ۴۵ درجه نسبت به محور طولی دندان را در محل اتصال لثه و دندان قرار داده شود.
- بسیار خود را به بازوی چپ والد تکیه دهد.
- موهای مسواك به روشن افقی روی همه سطوح دندانی به حرکت درآید.
- نباید والد جلوی کودک قرار گیرد، چون سر او بدون حمایت می‌ماند.
- برای سطح داخلی دندانهای جلو، مسواك را باید به صورت عمودی بر روی سطح داخلی دندانهای جلو قرار داد و با حرکت بالا و پایین این سطوح را تمیز کرد.
- برای مسواك کردن سطوح جونده، موهای مسواك را باید بر روی سطح جونده قرار داد و با فشار بر روی این سطوح و با حرکت جلو و عقب مسواك سطح جونده را به خوبی تمیز کرد.

◀ مشکلات تغذیه ای

بعد از ۵ روز :

کودک را از نظر وضعیت تغذیه ای ارزیابی کنید:

- ◀ در مورد هر مشکل تغذیه ای که در اولین مراقبت پی برده اید، سئوال کنید
- ◀ در مورد هر مشکل تغذیه که جدیداً یا قبلاً بروز کرده، مشاوره کنید.
- ◀ اگر در مشاوره با مادر، تغییر تغذیه ای قابل ملاحظه ای را مشاهده کرده اید، ازو بخواهید که بهمراه کودکش مجدداً مراجعه نماید

◀ اختلال رشد / رشد نامعلوم

بعداز ۰ روز کودک زیر ۲ ماه / بعداز ۱۵ روز کودک زیر یکسال / بعداز ۳۰ روز کودک بالای یکسال

کودک را از نظر وضعیت وزن ارزیابی کنید:

- ◀ اگر کودک اختلال رشد ندارد (شیرخوار زیر ۲ ماه بیش از ۲۰۰ گرم در ۱۰ روز وزن اضافه کرده باشد)، مادر را به ادامه توصیه ها تشویق کنید
- ◀ اگر کودک هنوز اختلال رشد دارد (شیرخوار زیر ۲ ماه کمتر از ۲۰۰ گرم در ۱۰ روز وزن اضافه کرده باشد)، وضعیت تغذیه ای او را بررسی کنید اگر مشکل تغذیه ای وجود ندارد براساس مقدار انحراف معیار (SD) وزن به قد یا درصد آن، ارزیابی و درمان مناسب براساس چارت مانا را انجام دهید

◀ رشد قدری نامطلوب / رشد قدری نامعلوم

بعداز ۳ ماه کودک زیر ۲ سال / بعداز ۶ ماه کودک بالای دو سال

کودک را از نظر وضعیت قد ارزیابی کنید:

- ◀ اگر کودک رشد قدری طبیعی دارد، مادر را به ادامه توصیه ها تشویق کنید
- ◀ اگر کودک رشد قدری طبیعی ندارد براساس مقدار انحراف معیار (SD) وزن به قد یا درصد آن، ارزیابی و درمان مناسب براساس چارت مانا را انجام دهید

◀ دورسر نامطلوب / دورسر نامعلوم

بعداز ۲ هفته کودک زیر ۶ ماه / بعداز ۱ ماه کودک بالای ۶ ماه

کودک را از نظر وضعیت دورسر ارزیابی کنید:

- ◀ اگر کودک دورسر طبیعی دارد، مادر را به ادامه توصیه ها تشویق کنید
- ◀ اگر کودک دورسر طبیعی ندارد با توجه به دورسر والدین، کودک را از نظر ماکروسفالی یا میکروسفالی بررسی کنید
- ◀ اگر موازی و صعودی بامنحتی رشد باشد ادامه مراقبت هارا انجام دهید

پیگیری

مشکلات تکاملی

بعد از ۲ هفته :

کودک را لازم‌نیزه و ضعیت تکاملی ارزیابی کنید:

- » اگر هنوز مشکل تکاملی (کلیدی یا غیرکلیدی) وجود دارد برای ارزیابی بیشتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید
- » اگر مشکل تکاملی (کلیدی یا غیرکلیدی) وجود ندارد مادر را تشویق کنید که برای مراقبتها بعده مراجعاً نماید

زردی خفیف:

بعداز ۱ روز :

شیرخوار را لازم‌نیزه های خطرناک ارزیابی کنید

- » اگر هریک از نشانه های خطرناک ارزیدار کده یا زردی به پایین تراز شکم گسترش پیدا کرده است فوراً اورا به نزدیکترین مرکز درمانی ارجاع دهید.
- » اگر گسترش زردی فرقی نکرده است، بعداز یک روز دیگر مجدد ارزیابی کنید اگر برای بار دوم فرقی نکرده به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید.
- » اگر گسترش زردی کمتر شده است به مادر توصیه کنید اگر زردی بیش از ۱۴ روز ادامه پیدا کرد نزد شما مراجعاً کند تا برای بررسی بیشتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع داده شود

برفک :

بعداز ۱۰ روز

دهان کودک را برای برفک نگاه کنید و همچنین لازم‌نیزه و ضعیت تغذیه ای او را ارزیابی کنید:

- » اگر برفک بدتر شده یا اگر کودک در پستان گرفتن یا مکیدن سینه مشکل دارد:
- » پنبه تمیز را به سریک چوب کبریت پیچیده (ویا یک گوش پاک کن را) با اسی سی محلول و موله دوزانسین آغشته کندو روی لکه های سفید (برفک) داخل دهان شیرخوار بمالدواین عمل را هر ۶ ساعت یکبار تکرار کند. در صورت عدم بهبودی بعداز ۱۰ روز به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید.
- » دارو به نوک و هاله پستان مادر هم مالیده شود
- » اگر برفک بهتر شده یا فرقی نکرده و شیرخوار مشکل تغذیه ندارد برای مدت ۵ روز دیگر درمان را ادامه بدهید.
- » اگر برفک بهبود یافته، دیگر درمانی لازم نیست.
- » اگر برفک بهتر شده یا فرقی نکرده و مشکل تغذیه ندارد برای مدت ۵ روز درمان را ادامه بدهید.


مشکلات دهان و دندان

بعد از ۵ هفته :


کودک را لازم‌نیزه دهان و دندان ارزیابی کنید:

- » اگر کودک و والدین طریقه مسواک زدن صحیح را آموخته اند، والدین را به ادامه توصیه ها تشویق کنید.
- » اگر کودک و والدین طریقه مسواک زدن صحیح را بخوبی یاد نگرفته اند، جهت آموزش کاملتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع شود.


وزن براي سن - بير 0-3 سال




وزن برای سن - دختر ۰-۳ سال



وزن جرای سدن - پسر ۳-۸ سال




وزن برای سن - دختر 3-8 سال




نیازمندی سن - بیسوس ۲۳-۰ ماه

سال اول


سال دوم




فهرای سن - دختر ۰-۲۳ ماه




قد برای سن - پسر 2-8 سال



قد برای سن - دختر 2-8 سال



دور سر برای سن - سر ۰-۱۸ ماه



دور سر برای سن- دختر 0-18 ماه

