

آموزش به بیمار و خانواده

مراقبت های پس از ترخیص

تاکی پنه (تندی تنفس

نام و نام خانوادگی:	تاریخ ترخیص:	تشخیص:	پرستار:	پزشک معالج:
بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:				
مراقبت در منزل: <ul style="list-style-type: none"> ❖ نوزاد را در بغل بگیرید تا تماس پوست انجام شود و از بیقراری نوزاد جلوگیری شود. ❖ سعی کنید تغذیه با شیر مادر را در وعده های بیشتر و زمان کمتر انجام دهید تا نوزاد خسته نشود. ❖ مراقب باشید نوزاد زیاد گریه نکند. عواملی مانند گرسنگی، کثیف بودن پوشش نوزاد موجب گریه و صرف انرژی و در نتیجه سختی تنفس نوزاد می شود. ❖ درمان نوزاد را به تعویق نیندازید. در صورتی که نوزاد از نظر پزشک جهت بررسی علل تاکی پنه نیاز به مشاوره قلب و انجام اکو و یا ... دارد، آن را پیگیری کنید. ❖ از بردن نوزاد در مکان های شلوغ و پر ازدحام و آلودگی هوا خودداری کنید. ❖ درجه حرارت بدن نوزاد را تا حد امکان ثابت نگه دارید. از بردن نوزاد در هوای سرد و گرم خودداری کنید. ❖ در هنگام تعویض لباس و حمام دادن از سرد شدن نوزاد جلوگیری کنید. اگر نوزاد سرد شد باید فوراً او را گرم کنید. تغییرات سریع درجه هوا می تواند باعث تاکی پنه گذرای نوزاد شود. ❖ محیطی آرام و راحت با حداقل سروصدای برابر نوزاد فراهم کنید. ❖ قبل از تماس با نوزاد شستن دست ها رعایت گردد و در صورتی فرد دیگری از نوزاد مراقبت می کند این موضوع را به او گوشزد کنید. ❖ در صورتی که دچار سرما خوردگی هستید از ماسک استفاده کنید و یا در صورت امکان از او فاصله بگیرید. ❖ از تماس افراد مبتلا به بیماری های عفونی و سرماخورده با نوزاد خود خودداری کنید. ❖ نوزاد در معرض افراد سیگاری قرار نگیرد. اگر شما یا فرد دیگری در منزل سیگار می کشد زمان آن رسیده است تا سیگار را ترک کنید. ❖ چند روز بعد از ترخیص حتماً به پزشک متخصص نوزادتان جهت پیگیری درمان مراجعه کنید. ❖ در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید <ul style="list-style-type: none"> ❖ افزایش تعداد تنفس به همراه تو کشیدن قفسه سینه در زمان بازدم و کبودی پوست نوزاد به خصوص در اطراف لب و اندام های تحتانی ❖ سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی 				